

Behandling af forstoppelse hos børn

Forstoppelse er, når afføringen er hård og svær at komme af med. Man taler om forstoppelse, når mindst 2 af følgende symptomer er til stede:

- Barnet har 2 eller færre afføringer om ugen.
- Barnet har mindst 1 'uheld' om ugen, hvor det laver i bukserne (gælder børn over 4 år).
- Der mærkes afføring i tarmen, når barnet undersøges af en læge.
- Barnets afføringer er hårde eller smertefulde at komme af med.

I Børne- og Ungeafdelingen foretrækker vi afføringsmidlet Movicol til at behandle forstoppelse med.

Formålet med behandlingen med Movicol er, at barnet får en blød, formet og smertefri afføring hver dag. Afføringen skal svare til type 4-5 på Bristolskalaen. I kan læse mere om skalaen og behandling af forstoppelse hos børn i pjecen "Viden om: Forstoppelse hos børn".

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Movicol kan bruges til børn i alle aldre og er ikke vanedannende. Movicol er et pulver, som blandes op i væske. Movicol findes med forskellig smag.

I begyndelsen af behandlingen kan barnet få diarré. Det er normalt, og selvom det sker, må behandlingen kun ændres efter aftale med afdelingen.

Det er vigtigt, at barnet får en tilstrækkelig dosis Movicol, og at midlet gives i tilpas lang tid. Når den rette dosis er fundet, skal barnet ofte fortsætte behandlingen i 3-6 måneder eller længere.

Ordnation

Husk, at Movicol ikke er vanedannende.

SÅDAN SKAL BARNET SIDDE PÅ TOILET-TET



.....fortsættes

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Børne- og Ungeafdelingen

Børneambulatoriet

Tlf. 97 66 34 05

Vi træffes bedst:

Onsdag 8.00 – 9.00

Børneambulatoriet

Tlf. 97 66 34 00

Børne- og Ungedagafsnit

Tlf. 97 66 34 12