

Sådan lindrer du symptomer på falsk strubehoste hos dit barn

Falsk strubehoste er en hævelse omkring stemmelæberne, som skyldes forkølelsesvirus i luftvejene. Sygdommen optræder hyppigst i vintermånederne og rammer især børn i alderen fra 6 måneder og op til 5 år. Det skyldes, at børn i denne aldersgruppe har snævre luftrør.

De fleste børn får aldrig falsk strubehoste, men andre får sygdommen gentagne gange. Børn, der har tendens til falsk strubehoste, vokser som regel fra denne tendens inden skolealderen.

SÅDAN VISER FALSK STRUBEHOSTE SIG

Børn med falsk strubehoste har en karakteristisk tør og gøende - 'søløveagtig' – hoste, der forværres ved gråd og hoste. Barnet kan være hæst og have svært ved at trække vejret. Når barnet ligger ned, mærkes hævelsen af stemmebåndene mest, og derfor er barnets symptomer ofte værst om natten. Barnet vågner med besværet vejtrækning og en ofte gøende hoste, og det kan have svært ved at tale. Ofte græder barnet også og er bange.

SÅDAN SMITTER FALSK STRUBEHOSTE

Falsk strubehoste smitter som forkølelsesvirus ved indånding af de små usynlige dråber, som spredes ved hoste eller nysen. Smitte giver ikke nødvendigvis falsk strubehoste, men måske andre symptomer som fx forkølelse eller bronkitis.

Virus kan sidde på hænderne og føres direkte fra hånd til hånd, eller den kan smitte indirekte via det, man rører ved, fx legetøj og sutter.

Dit barn er smittet fra 2-8 dage, før det er blevet sygt.

Sygdommen varer som regel kun få dage.

Dit barn er kun beskyttet mod ny smitte i 2-3 måneder. Det er dog sjældent, at et barn får sygdommen flere gange i samme sæson.

Grundig håndvask og afspritning af hænder forebygger spredning af smitte.

SÅDAN LINDRER DU SYMPTOMERNE

Hvis dit barns vejtrækning bliver meget besværet, kan der gives medicin som inhalation eller tabletter for at mindske hævelse i struben.

Der findes dog ingen egentlig behandling af virus. Kroppen bekæmper den selv. Det bedste, du kan gøre, er derfor at forsøge at lindre dit barns symptomer. Følg disse anvisninger:

- Har dit barn besværet vejtrækning, kan den lattes, ved at barnet sidder op og kan trække vejret i frisk og kold luft.
- Åbn vinduet eller klæd barnet på og gå med det ud i den friske luft.
- Prøv at berolige dit barn, så du undgår, at det græder og dermed hoster. Er barnet bange, kan tilstanden forværres.
- Tilbyd barnet koldt at drikke i små og hyppige portioner, når barnet er roligt.
- Lad barnet sove med hovedet højt og gerne halvt siddende i et køligt rum.
- Har dit barn ondt og/eller feber, kan det være en god idé at give det smertestillende medicin fra håndkøb, der indeholder stoffet paracetamol. Du kan enten give medicinen som mikstur, som tablet eller som stikpille. Følg lægens anvisning eller instruksen på pakken.

- Søg læge, hvis dit barns vejrtrækning og almentilstand forværres.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Børne- og Ungeafdelingen

Sekretariatet

Tlf. 97 66 33 30

Børneambulatoriet

Tlf. 97 66 34 00

Børnemodtagelsen

Tlf. 97 66 34 21

Børne- og Unge dagafsnit

Tlf. 97 66 34 12

Børne- og Unge døgnafsnit

Etage 1

Tlf. 97 66 34 25

Børne- og Unge døgnafsnit

Etage 2

Tlf. 97 66 64 33

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 14.00